

第2類医薬品

みずむし・たむし用薬

ピロエースW[®]クリーム

ピロエースWクリームの特徴

1.すぐれた抗白癬菌作用があります。

抗生素質ピロールニトリンと抗真菌剤クロトリマゾールの協力作用により、効率的に白癬菌を消失させ、炎症等の症状を改善します。

2.すぐれた鎮痒効果があります。

鎮痒剤のクロタミトンが、不快なかゆみをとります。

3.べとつかない、塗りごこちのよいクリーム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

(1) 目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等

(2) しつしん

(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 乳幼児

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 患部が広範囲の人

(5) 患部が化膿している人

(6) 「しつしん」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、しつしん等他の原因による場合が多い)

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4.使用後、症状がかえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が使用前より広がる等)は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

使用法

1日2~3回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。

患部をよく洗ってから薬剤を塗布して下さい。患部の汚れをとると同時に皮膚をやわらかくして薬剤の浸透を助けます。この意味から入浴後の治療は効果的です。みずむし・たむしは再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからもしばらくの間は治療を続けることが大切です。

成 分・分 量

本剤は、白色のクリーム剤で、100g中に次の成分を含有しています。

ピロールニトリン 0.2g(力価)

クロトリマゾール 0.4g

クロタミトン 5g

添加物:オクチルドデカノール、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤

塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、短時間のうちに消失します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。

- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり品質が変わります)

- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

東興薬品工業株式会社

富山県中新川郡立山町辻20