

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# スマイル40 メディクリアDX

眼科用薬

第2類医薬品


かゆみ・充血を治す。目やに<sup>※1</sup>が気になる時にも。<sup>※1</sup>目のかすみ(目やにの多いときなど)

かゆみ・充血などトラブル症状を **もともとから治す!**

※2 軽度なこすれを受けた角膜細胞

## 涙をとどめ、角膜を修復する

— ビタミンA 配合 —



涙が減少し、角膜が傷つくと、かゆみや充血などのトラブルを引き起こす。

かゆみや充血などの「つらい」を治す 成分配合

**かゆみ抑制**

クロルフェニラミンマレイン酸塩

**充血除去**

塩酸テトラヒドロゾリン

**代謝促進**

ビタミンE、ビタミンB6

**炎症鎮静**

生薬由来抗炎症成分

・ベルベリン塩化物水和物 ・グリチルリチン酸二カルウム

**防腐剤  
無添加**

スマイルの独自技術により防腐効果を持たせています。

**スマイル 防腐剤無添加** 検索

防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)を配合していません。  
使用期限や保管方法も防腐剤配合の目薬と同様にお使いいただけます。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 目のかすみが改善されない場合。  
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

## ●効能


- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 目の疲れ
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## ●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

## ●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	10,000単位	角膜に直接働き、目の機能を活性化するビタミンです。
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を目に補給するビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.08g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.02g	目の充血を抑えます。
ベルベリン塩化物水和物	0.01g	抗菌・抗炎症作用のある生薬由来の成分です。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25g	抗炎症作用のある生薬由来の成分です。

添加物として、ホウ酸、トロメタモール、エデト酸Na、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、*l*-メントール、*dl*-カンフル、*d*-ボルネオール、ユーカリ油を含む。

## ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。
- (7) 液色は生薬由来成分を配合しているため黄色です。衣類などにつくと着色することがありますので、つかないように充分注意してください。
- (8) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。透明フィルム開封後は脱酸素剤を捨ててください。  
◇ 自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

## —お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください  
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**ライオン株式会社**  
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28