

のどの殺菌・消毒

# のどぬる スプレーB

## 痛いのどの ウイルス・菌を殺菌

患部に当たる  
ロングノズル



第3類医薬品



### △使用上の注意

#### ⊗(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 甲状腺疾患のある人 (3) 2才未満の乳幼児 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (5) 授乳中の人
2. 長期連用しないこと 3. 大量に噴射しないこと

#### ⊠(相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人: 口内のひどいただれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要などに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

#### 〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること ●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること ●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること ●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

#### ＼あったらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

**0120-5884-01**  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

Throat Disinfectant **第3類医薬品**

のど用殺菌消毒薬

販売名: のどぬるスプレーB  
〔効能・効果〕のどの殺菌・消毒  
〔用法・用量〕1日数回、適量を患部に噴射してください

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1) ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること (息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある) (2) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4) のど用にのみ使用すること (5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

#### 〔成分・分量〕100mL中

ヨウ素……………0.5g  
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、エタノール、l-メントール、香料を含有する

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931