

ものもらい・結膜炎に

第2類医薬品

サンテメディカル 抗菌 [眼科薬]

ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの皮脂腺やまつげの根元に入り込んで、化膿性の炎症を引き起こしまぶたが腫れる目の感染症です。また、結膜炎は細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。**サンテメディカル抗菌**は、高粘度の薬液が患部に長くとどまって効く独自の製剤設計の目薬です。抗菌成分スルファメトキサゾールが細菌の繁殖を抑制。グリチルリチン酸二カリウムが患部の炎症を抑え、タウリンとビタミンB₆が傷ついた組織の代謝を促進します。清潔な1回使いきりタイプで、防腐剤は無添加。小さなお子さま(1歳以上)にも使えるやさしいさし心地です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

＊1. 次の人は使用しないでください。

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

＊まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

用法・用量

1回1滴、1日3～5回 点眼してください。

●次の注意事項をお守りください。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。




1回使いきりタイプ

点眼後、一度開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。

[開け方]

キャップ部分を無理にひっぱらず、
ゆっくり回して開けてください。



裏面につづく

効能・効果

ものもらい、結膜炎（はやり目）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ
「ものもらい」についての注意：まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。）

成分・分量

成 分	分 量	はたらき
スルファメトキサゾール （抗菌成分）	4.0%	持続性サルファ剤で、ものもらいや結膜炎の原因菌に抗菌作用を示します。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	患部の炎症を抑えます。
タウリン	1.0%	目の組織代謝を活発にします。
ビタミンB6	0.1%	目の組織代謝を活発にします。


添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ヒプロメロース、ホウ酸、pH調節剤を含有します。

成分・分量に関連する注意

本剤は点眼後、ときに口中に苦味または甘味を感じることがあります。これは主成分スルファメトキサゾールおよびグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。
 また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
 （誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本剤は光による薬液の変質を防ぐため、着色容器・着色袋を使用していますが、保存する場合は箱に戻すなど、光の当たらない所に保管してください。
- (6)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップが開くことがありますので注意してください。
- (7)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、袋を開封後はできるだけ速やかに使用してください。



包 装 0.3mL×20本入り

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
 お願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、
 お電話を録音させていただいております。

製造販売元 **参天製薬株式会社**
 大阪市北区大深町4-20
www.santen.com/jp