

この外箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

■使用上の注意 ●**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の部位には使用しないこと。(1)目や目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたの様に皮フがはがれているところ(4)炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

●**相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

■**保管及び取り扱い上の注意** (1)本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと。(2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること。(3)小児の手の届かないところに保管すること。(4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

開封口

① 押してあける



② 解体できます



こんな症状に…



Medicine for dry skin

販売名: **メンソレータム やわらか素肌クリームU** 第3類医薬品

効能・効果 手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用法・用量 1日数回、適量を患部にすりこんでください。

<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を守ること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。(4)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないこと。

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

MADE
IN
JAPAN

お客さま安心サポートデスク

東京: 03-5442-6020
大阪: 06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



メンソレータム®
やわらか素肌クリーム

角質柔軟処方

**尿素
20%
配合**

もっちりつるつとした素肌に

**ゴチゴチのかかと
などの治療薬**

第3類医薬品


皮フ軟化薬

ロート製薬

3つの有効成分配合。
かたくなった皮フを

肌本来のやわらかさへ戻します。

【かたく、ゴワついた肌】



尿素のはたらき

- ①角質をやわらかくする。
- ②皮フに水分を取り込む。

+ 血行促進
(ビタミンE誘導体)

+ 抗炎症
(グリチルリチン酸-アンモニウム)

さらに、2つの油性基剤(ワセリン・スクワラン)配合。

■成分(1g中) 尿素…200mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)…5mg、グリチルリチン酸-アンモニウム…5mg
●添加物として、L-メントール、流動パラフィン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、スクワラン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、2-エチルヘキサン酸セチル、ペクチン、乳酸、2,2',2''-ニトリロトリエタノール(トリエタノールアミン)、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、パラベン、BHT、エデト酸Na、グリシンを含有する。