



メンソレータム®

エクシブ®

W きわケア®ジェル



目立って気になる

爪まわりなどの水虫に

爪まわりは凹凸があり、治療薬がなかなか届きづらい場所です。「メンソレータム®エクシブ®W きわケア®ジェル」は爪ぎわに潜む水虫菌にまで抗真菌剤をスーッと浸透させることで見た目が気になる爪まわりの水虫を治療することを考えた水虫治療薬です。

特徴

抗真菌剤

「テルビナフィン塩酸塩」配合

爪ぎわに潜む水虫菌まで、浸透殺菌します。

届きづらい爪ぎわまで!

スーッと浸透するジェルタイプ

- 水虫による炎症を抑える
「グリチルレチン酸」配合
- かゆみを鎮める
「リドカイン」「ジフェンヒドラミン塩酸塩」配合
- におい菌も殺菌する
「イソプロピルメチルフェノール」配合



[爪まわりの水虫治療のポイント]

清潔に保つ


清潔は水虫治療の第一条件です。患部はせっけんでよく洗い、いつもすっきり清潔に保ちましょう。

しっかり乾燥

水虫菌は乾燥が苦手です。汗をかいたりぬれたりした後は、タオルで患部を拭いてしっかり乾燥させましょう。

薬は爪との境目の皮フに塗りこむ

薬は爪との境目の皮フに塗りこんでください。薬の塗布は皮フがやわらかくなっているお風呂上がりがおすすです。



根気強く治療を続ける

水虫菌はしつこい菌です。症状が治まり、治ったかな?と思っても水虫菌は死滅していないことが多く、再発の原因になります。根治するためには、症状が治まったと思ってもしばらくの間は治療を続けましょう。

※爪水虫は医師のもと、適切な治療が必要です。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

水虫・たむし用薬 【販売名】メンソレータムエクシブWきわケアジェル

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
 - (2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い) (7) 妊婦又は妊娠している可能性のある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*:全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくなり場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 テルビナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 1.0g、リドカイン 2.0g、
 (100g中) ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、グリチルレチン酸 0.1g
 添加物として、エタノール、乳酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポビドン*、ヒプロメロース、トコフェロール酢酸エステル、ニコチン酸アミド、スクワラン*、ヒアルロン酸Na*、香料を含有する。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
 なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (6) 本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようご注意ください。
- (7) 火気に近づけないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

MADE IN JAPAN