

ハイチオール Bクリア。

第3類医薬品

ビタミンB2主薬製剤

ハイチオールBクリアは、肌代謝を助けるアミノ酸 "L-システイン" とビタミンB群、ビタミンCを配合。体の内側から肌細胞に働きかけ、 肌全体の調子を良くし、肌あれなどに効果を発揮する医薬品です。

●体の内側から、肌あれなどを改善し、肌の調子を良くします。

肌代謝を助けるアミノ酸 "L-システイン" とビタミンB群、ビタミンCを配合した処方が、脂質代謝やコラーゲン生成を助けるとともに、肌細胞の生まれ変わりを正常化します。肌あれやにきびを改善し、キメの整ったクリアな肌へと導きます。

●疲れにも効果を発揮します。

バランスよく配合した6種類のビタミンB群が、栄養素を効率よくエネルギーに変換し、疲れにも効果を発揮します。

●1日1回のみの服用で効果を発揮。しかも、小粒で飲みやすい錠剤です。 飲み忘れが少ない、1日1回の服用。独自技術のフィルムコーティングを採用。 サイズも小粒で飲みやすい錠剤となっています。

/ 使用上の注意



相談すること

1 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感



2 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能·効果

○次の諸症状の緩和:

肌あれ、にきび、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、 目の充血、目のかゆみ、赤鼻

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師又は薬剤師に相談してください。」

○次の場合のビタミンB₂の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	11才~14才	11才未満
1回量	3 錠	2 錠	X 服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。

成 分 3錠(成人1日量)中

L-システイン ······80mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル) ···38mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) ·························50mg
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩) ················10mg
ニコチン酸アミド······40mg
ビオチン · · · · · · · · 100μg
パントテン酸カルシウム ······20mg
アスコルビン酸(ビタミンC) ······50mg

添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳酸Ca、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸、三二酸化鉄、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体

○本剤配合成分のビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5) ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。 開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 00 0120-028-193 受付時間:9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

