

ビタミンC主薬製剤

水なしで服用
できる

チュアブル
タイプ



このツマミを引いて開けてください。はさみを使わず開封できます。

しみ・そばかす
色素沈着に

Vitamin

C

ビタミンC 2000mg

(成人1日最大量中)

第3類医薬品

この袋の記載事項は、服用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう本剤を入れて保管してください。

ビタミンC主薬製剤

第3類医薬品

ビタミンC2000 チュアブル「UTY」

【効能・効果】

1. 次の諸症状の緩和…しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着 2. 次の場合の出血予防…歯ぐきからの出血、鼻出血 3. 次の場合のビタミンCの補給…肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
※ただし、上記1及び2の症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】 次の量を、口の中できちんとかすか、又はかみくだいて服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	1~3回
11歳以上15歳未満	4錠	1~2回
7歳以上11歳未満	2錠	1~3回
5歳以上7歳未満	2錠	1~2回
5歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
2. 用法・用量を守ること。
3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

【成分・分量】

12錠(成人の1日最大服用量)中に次の成分を含みます。

成分	含量
ビタミンCとして ビタミンC(アスコルビン酸) アスコルビン酸ナトリウム うちビタミンC(アスコルビン酸)	2,000mg 920mg 1,215mg 1,080mg
酪酸リボフラビン(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6mg

＜成分・分量に関連する注意＞

1. 本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、酪酸リボフラビン(ビタミンB₂)によるもので心配ありません。
2. 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがありますので、医師の治療や検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
3. 錠剤により成分のビタミンB₂(リボフラビン)による赤い斑点がみられる場合がありますが、効果には変わりありません。

添加物：白糖、乳糖、セルロース、香料(オレンジ)、ステアリン酸マグネシウム、マンニトール、ヒプロメロース、トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 錠剤に水がついたり、袋のチャックの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質するおそれがありますので、ぬれた手で錠剤に触れないこと。また、服用のつどチャックをしっかり閉めること。袋の中にある乾燥剤は、開封後も必ず入れたままにしておくこと。乾燥剤は絶対にのまないこと。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヶ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



使用上の注意

❌ してはいけないこと(守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

☞ 次の人は服用しないでください。 ○ フェニルケトン尿症の人

■ 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続、または、増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師、または登録販売者にご相談ください。 ○ 下痢

副作用被害救済制度

ホームページアドレス:

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社グラフィコ お客様医薬品相談窓口

電話: 03-5642-7200 受付時間: 平日10:00~16:00

KS 2202



製造販売元
株式会社グラフィコ 東京都中央区日本橋人形町3-1-17