

2012年3月改訂  
(記載要領変更に伴う改訂)

第3類医薬品

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

# 血清高コレステロール改善薬 動脈硬化症の予防・高コレステロール血症の改善に **ヘルスオイル**

## 動脈硬化症とは……

血管（動脈）の壁に悪玉コレステロールをはじめ、いろいろな物質がしみ込み、蓄積されて血管壁が厚く硬くなり、狭くなるため血液の流れが悪くなる状態をいいます。ヘルスオイルは4種類の有効成分が悪玉コレステロールを低下させ、動脈硬化症の予防に相乗的な効果があります。

## ！使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感、胸やけ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

動脈硬化症の予防、高コレステロール血症の改善

## 用法・用量

成人1回 2カプセル 1日3回食後に服用してください。

15才未満の小児は服用しないでください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

※裏面も必ずお読みください。

## 成分・分量

1日量（6カプセル）中

成 分	分 量	は た ら き
トコフェロール 酢酸エステル (ビタミンE)	10mg	リノール酸などの不飽和脂肪酸が酸化して有害な過酸化脂質になるのを防ぐとともに、末梢血管の循環を改善します。
ジパルミチン酸 ピリドキシン (ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg	脂質の代謝に関与し、脂肪が体内に蓄積しないようにはたらきます。
カルバゾクロム	2mg	毛細血管の抵抗性を高め、血管強化作用があります。
混合植物油 (リノール酸として)	1170mg (750mg)	体内で合成することができない必須脂肪酸の1種であるリノール酸を含む植物油です。悪玉コレステロールを低下させるはたらきがあり、血管壁に悪玉コレステロールがたまらないようにし、動脈硬化症を予防する効果があります。
添加物として、硬化油、ゼラチン、グリセリン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60を含有。		

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わってしまいます)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 製品を取り出すときに濡れた手で触らないようにご注意ください。  
(品質が変わる原因となります)

また開封後は服用のつど、しっかりフタを閉めて6ヶ月以内を目安に服用してください。

### お問い合わせ先

中央薬品株式会社 お客様相談窓口  
電 話 076-493-5010  
受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

製造販売元



中央薬品株式会社

® 富山県富山市西四十町4-9

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931