

ご使用に際して、この説明文書を  
必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう  
大切に保存してください。

# つらい目の疲れ・かすみに スマイル40EX ゴールドマイルド

目薬

第2類医薬品

## 8種の有効成分が効く

|      |                                                                                    |                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 〈作用〉 |   | ・角膜修復促進 ▶ ① ビタミンA<br>・血行促進 ▶ ② ビタミンE<br>・新陳代謝促進 ▶ ③ ビタミンB <sub>6</sub>          |
|      |   | ・栄養補給 ④ タウリン<br>・酸素補給 ⑤ L-アスパラギン酸カリウム                                           |
|      |  | ・ピント調節 ▶ ⑥ ネオスチグミンメチル硫酸塩<br>・かゆみ抑制 ▶ ⑦ クロルフェニラミンマレイン酸塩<br>・充血除去 ▶ ⑧ 塩酸テトラヒドロゾリン |

防腐剤  
無添加

スマイルの独自技術により防腐効果を持たせています。  
使用期限や保管方法は防腐剤配合の目薬と同様です。

スマイル 防腐剤無添加 検索

防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)を配合していません。

ツイストキャップの開閉方法 ▶ 必ずキャップを真上に向けて開閉してください。

### ① 開け方


容器の側面をもち  
キャップをひねる



容器の広い部分をもって開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

### ② 閉め方

音がするまで  
キャップを  
まっすぐ押す



カチッ

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い |

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

## ●効能

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## ●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

## ●成分(100mL中)

| 有効成分                           | 含量       | はたらき                      |
|--------------------------------|----------|---------------------------|
| レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)         | 33,000単位 | 角膜に直接働き、目の機能を活性化するビタミンです。 |
| 酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)        | 0.05g    | 血行を促進して、栄養を目に補給するビタミンです。  |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) | 0.03g    | 新陳代謝を促す作用があるビタミンです。       |
| タウリン                           | 0.1g     | 新陳代謝を促す作用があるアミノ酸類です。      |
| L-アスパラギン酸カリウム                  | 1.0g     | 目に酸素を取り込むアミノ酸類です。         |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩                  | 0.005g   | 目のピント調節機能を改善します。          |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩                | 0.03g    | 目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。       |
| 塩酸テトラヒドロゾリン                    | 0.01g    | 目の充血を抑えます。                |

添加物として、ホウ酸、トロメタモール、エデト酸Na、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、等張化剤、pH調整剤を含む。

## ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

◇自然環境に配慮し、携帯袋は入れておりません。

## —お問合せ先—

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**ライオン株式会社**

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7