

アリナロングZXコンドロ錠

第3類医薬品

—— コンドロイチン硫酸、フルスルチアミン、ビタミンB6、B12、E配合 ——

中高年の膝と腰の痛みは、変形性関節症といわれ、関節の軟骨が衰え、すり減って起こる場合が多くあります。本剤は、関節軟骨の内に多く含まれ、保水や弾力性を保つことで骨と骨の間のクッションの役割を果たしているコンドロイチン硫酸を主体に、神経や筋肉に強く作用するフルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)を始め、ビタミンB6、B12、Eを配合しており、ひざ、関節痛、腰痛、神経痛、五十肩などに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、消化器に吐き気・嘔吐、口内炎の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合、又は1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●成分・分量 6錠(1日量)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム … 900mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) …… 30mg
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体) シアノコバラミン(ビタミンB12) …… 60μg
(フルスルチアミンとして100mg) …… 109.16mg トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) …… 30mg
添加物として、塩酸グルコサミン(緩衝剤)、セルロース、カルメロースカルシウム、乳糖水和物、無水ケイ酸、二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有します。

●用法・用量

15歳以上	1回2錠	1日3回 食後に服用してください。
7歳以上 15歳未満	1回1錠	7歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●効能

- ・次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- ・脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- ・次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4)外箱に表示した使用期限内に服用してください。また、品質保持の点から、開封後は6ヵ月以内を目安に服用してください。

●空気中の湿気などにより、変色など錠剤が変質することがありますので、次のことを守ってください。
○使用後は、必ず密栓してください。○ぬれた手で触れないでください。○開封後は吸湿のおそれがありますので、ビンの中の詰め物を捨ててください。(詰め物は輸送中、錠剤の破損を防ぐためのものです。)

