

HapYcom

第3類医薬品

ねむけ・  
だるさ

モリピン内服液

カフェイン  
200mg  
配合

服用に際しては、次の説明書きをよくお読みください。

**効能・効果**:ねむけ・倦怠感の除去**用法・用量** 成人(15歳以上)1日1回1びん(30mL)を服用してください。●1日2回以上の服用は避けてください。●15歳未満は服用しないでください。**成分・分量** 1びん(30mL)中 カフェイン水和物200mg・L-リシン塩酸塩100mg・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム120mg・タウリン500mg・ニコチン酸アミド20mg・パントテン酸ナトリウム30mg・チアミン塩化物塩酸塩10mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム2mg・ピリドキシン塩酸塩1mg  
添加物:クエン酸、クエン酸Na、L-グルタミン酸Na、カラメル、白糖、ブドウ糖、安息香酸Na、パラベン、香料(アルコール0.15mL以下)**使用上の注意** [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1.次の人は服用しないでください(1)次の症状のある人 胃酸過多(2)次の診断を受けた人 心臓病、胃潰瘍 2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の眠気防止薬 3.コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください 4.短期間の服用にとどめ、連用しないでください[相談すること] 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	消化器	精神神経系	循環器
症状	食欲不振、吐き気・嘔吐	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛	動悸

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。副作用被害救済制度  
☎ 0120(149)931製造販売元  
**森田薬品工業株式会社**  
広島県福山市大門町野々浜1059番地  
お客様相談室：電話 (084)943-8171

A208E1A (H)