

第3類医薬品

日本薬局方

ビタミンC

アスコルビン酸

原末



岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2

C
6
H
8
O
6

IWAKI

A2

お知らせ

アスコルビン酸(ビタミンC原末)は、空気及び湿気によりキャップ及びボトルに付着した粉末が褐色に変化することがあります。

添付のスプーンすりきり1杯が
岩城製薬のアスコルビン酸(ビ
タミンC原末)約1g(約1000mg)です。

スプーン

パイプ



●図のようにパイプを差しこんでご使用ください。

開封年月日

年 月 日

開封時に記入してください。

ご使用に際して、この外箱を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 販売名 **ビタミンC「イワキ」**



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合は、服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 1日2回朝・夕の食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1g	2回
15歳未満の小児	服用させないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

・定められた用法・用量を守ってください。

成分・分量 2g(1日量)中 アスコルビン酸2g含有

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。
これらの検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお話してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても速やかに服用してください。使用期限は容器及び外箱に表示してあります。

お問い合わせ先

お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

岩城製薬株式会社 電話(03)3668-1573

受付時間 平日 9:00~17:00

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

添付のスプーンを計量の目安にご使用ください。