

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

生薬製剤

銀翹散エキス顆粒Aクラシエ

(ギンギョウサン)

特 徴

- 「銀翹散エキス顆粒Aクラシエ」は、漢方の古典といわれる中国の医書「ウンビョウジョウベン温病条弁」に収載されている「銀翹散」という薬方を基本に創られた処方です。
- かぜによるのどの痛みや頭痛・せきなどの症状に効果があります。

⚠使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4)胃腸の弱い人
 - (5)高齢者
 - (6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (7)次の症状のある人
むくみ
 - (8)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かぜによるのどの痛み・口（のど）の渇き・せき・頭痛

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	1／2包	
7才未満5才以上	1／4包	
5才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量3包（1包2.3g）中、次の成分を含んでいます。
銀翹散エキス粉末 ……………5,900mg
〔キンギンカ・レンギョウ各4.26g、ハッカ・キキョウ・カンゾウ各2.556g、タンチクヨウ・ケイガイ各1.704g、タンズシ・ゴボウシ各2.136gより抽出。〕
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ケイ酸Alを含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。
また本剤は、生薬精油成分（においのする成分）を含んだエキスを使用しておりますので、漢方薬特有のにおいがします。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）