

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限（パッケージ側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

第2類医薬品

漢方製剤



販売名：ユービケア

### 製品特徴

1. こわばりや痛みで手指が動かしにくい方のための漢方薬です
2. 漢方処方「桂枝加苓朮附湯（けいしかりょうじゅつぷとう）」が、血流が低下し、炎症が蓄積しやすい手指の関節に効きます
3. 血流を促進していくとともに、抗炎症作用と鎮痛作用により、手指がスムーズに動かせるようになります

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
  - (4) 高齢者
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人  
むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

(裏面につづく)

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに動悸、めまい、筋肉のぴくつきがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
7才以上15才未満	2 / 3包	
4才以上7才未満	1 / 2包	
2才以上4才未満	1 / 3包	
2才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量 1日量(3包:4.5g)中

桂枝加苓朮附湯エキス…2.4g

ケイヒ……………2.0g	シャクヤク……………2.0g
タイソウ……………2.0g	ショウキョウ……………0.5g
カンゾウ……………1.0g	ビャクジュツ……………2.0g
ブクリョウ……………2.0g	ブシ末……………0.25g
	より抽出

添加物として、二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること
- また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)  
**0120-5884-01**  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
〒635-0051  
奈良県大和高田市大字根成柿574番地

MADE IN JAPAN