



小林製薬

第3類医薬品

45,小林製菜

Throat 第3類医薬品

のど用殺菌消毒薬

販売名:のどぬーるスプレー EXクール 〔効能・効果〕のどの殺菌・消毒 〔用法・用量〕1日数回、適量を 患部に噴射してください

<用法・用量に関連する注意> (1)ノズルをのどの患部にむけ て、軽く息をはきながら噴射 すること(息を吸いながら使 用すると、液が気管支や肺に 入ることがある)(2)小児に 使用させる場合には特に注意 し、保護者の指導監督のもと に使用させること(3)目に入 らないように注意すること 万一、目に入った場合には、す ぐに水又はぬるま湯で洗う こと。なお、症状が重い場合 には、眼科医の診療を受ける こと(4)のど用にのみ使用す ること(5)薬液を誤って大量 に飲み込んだときは、直ちに 医師の診療を受けること

〔成分·分量〕100mL中

ヨウ素······0.5g

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、 I-メントールを含有する

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ プロピレングリコール含有物 水溶性

⚠使用上の注意

⊗(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が 起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと(1)本剤又は本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)甲状腺疾患のある人(3)2才未満の乳幼児(4)妊婦又は妊娠していると思われる人(5)授乳中の人
- 2.長期連用しないこと 3.大量に噴射しないこと

≝ (相談すること)

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は 登録販売者に相談すること(1)医師又は歯 科医師の治療を受けている人(2)薬などにより アレルギー症状を起こしたことがある人(3)次 の症状のある人:口内のひどいただれ
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあるその場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
アナフィラキシー	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのか
様症状	ゆみ、息苦しさ等があらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限 (パッケージ底面および容器ラベルに記載) を過ぎた製品は使用しないこと

〔保管および取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、キャップをしっかりしめて立てて保かり、中ではなったの手をとの容器に保管するとの容器に入れ替えないこが変に入れ替えない。との変になったり品質がある。(4)火気に近づけないとのプロピレングリコール含有物)

●使用後は、必ずキャップをして ノズルをもとの位置にもどして保 管すること●携帯する場合は、添 付のビニール袋に入れること●使 用中に薬液がこぼれ衣類などが 着色したら、すぐに水洗いすること と●液が出ないときは、液が出る までくり返し押すこと。またノズ ルの先端を針などで突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

\あったらいいな/をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社** 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ http://www.kobayashi.co.jp

製造販売元小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931