



非ステロイド剤

速効!

尿かぶれ^{などによる}痛がゆさに

大人のデリケートゾーンの痛がゆさ・ヒリヒリに



フェミニナUP_a

尿かぶれ治療薬

抗炎症

かゆみ止め

低刺激性

尿パッド・尿 などによるかぶれに

肌なじみがよく

べたつかない
クリーム

第2類医薬品

販売名：フェミニーナUPa Anti-Itch Cream

第2類医薬品 外用皮ふ・湿疹用薬

本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ腔カンジダ錠等カンジダ治療薬と併用しないでください

**特
徴**

- 尿やパッドなどによりデリケートゾーンにおきた炎症を鎮める塗り薬です
- かゆみを素早く鎮める成分配合です
- 非ステロイド性のクリームです

⚠ 使用上の注意

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

×してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと：カンジダ症の人

■相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3. 1～2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 皮ふ炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、おむつかぶれ、ただれ、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞ (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること (4) 患部を清潔にした後、塗布すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

成分・分量 100g中

成 分	分量	はたらき
ウフェナマート	5.0g	抗炎症成分
ジフェンヒドラミン	1.0g	抗ヒスタミン成分
グリチルレチン酸	0.3g	抗炎症成分

成 分	分量	はたらき
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	ビタミン成分
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌成分
リドカイン	1.0g	局所麻酔成分

添加物として、セタノール、ラノリンアルコール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、1, 3-ブチレングリコール、グリセリン、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、ステアリン酸K、パラベン、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

腔内、腔入り口、尿道付近等粘膜部位への使用はおやめください。粘膜部分がかゆい場合やおりものに異常を伴う場合は、腔カンジダ等の可能性も考えられますので、病院を受診することをお勧めします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

10215891 MADE IN JAPAN

押して開ける