

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 **ロキソニンEXテープL** 第2類医薬品

特徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ[ロキソプロフェンナトリウム水和物]を8.1%配合。

さらに2つの有効成分を追加配合。
つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。こだわりの薄型設計で、
貼り心地やはがれにくさを追求。

広範囲な部位に使いやすい、
大判サイズ。



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用して
ぜんそくを起こしたことがある人
(3) 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) しっしん、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさ
えるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師
の診療を受けて下さい)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者
(5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざが できる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の
診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の かすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状
の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢・軟便
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(他の疾患の可能性もあります)

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、
肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。
(用法・用量に関連する注意) (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 本剤は、痛みや
はれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを
治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3) 1日あたり2枚を超
えて使用しないで下さい。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きと
ってから使用して下さい。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、
1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状
が起きないことを確かめてから使用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えない
で下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 品質保持のため、
開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を
開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェンナトリウム 水和物	8.10g (無水物として7.14g)	炎症や痛みのもと[プロスタグランジン] をおさえます。
トコフェロール酢酸エステル	2.3g	患部の血行を促進し、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリ
ンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分

[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量1.4g]

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

MADE IN JAPAN

製 造 リードケミカル株式会社
販売元 富山県富山市日俣77-3

