使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



第2類医薬品

2

91130

ニコチンガム製剤

特徴

- ●ニコレットクールミントはタバコをやめたいと望む人のための医薬品で,禁煙時のイライラ・集中困難などの症状を 緩和します。(タバコをきらいにさせる作用はありません)
- ●使用期間は3ヵ月をめどとし、使用量を徐々に減らすことで、あなたを無理のない禁煙へ導きます。
- ●タバコを吸わない人や現在吸っていない人は、身体に好ましくない作用を及ぼしますので使用しないでください。
- ●シュガーレスコーティングで、かみやすいニコチンガム製剤です。

⚠ 使用上の注意

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は使用しないこと
- (1) 非喫煙者 (タバコを吸ったことのない人及び現在タバコ を吸っていない人〕(吐き気、めまい、腹痛などの症状があ らわれることがある。)
- (2)すでに他のニコチン製剤を使用している人
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4)重い心臓病を有する人
 - 1)3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人
 - 2)重い狭心症と医師に診断された人
 - 3)重い不整脈と医師に診断された人
- (5)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人
- (6)うつ病と医師に診断された人
- (7)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤. かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人
- (8)あごの関節に障害がある人
- 2. 授乳中の人は本剤を使用しないか,本剤を使用する場合は 授乳を避けること

(母乳中に移行し、乳児の脈が速まることが考えられる。)

- 3. 本剤を使用中あるいは使用直後に次のことをしないこと (1)喫煙
 - (2)ニコチンパッチ製剤の使用
- 4.6ヵ月を超えて使用しないこと



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に 相談すること
- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)他の薬を使用している人
 - (他の薬の作用に影響を与えることがある。)
- (3)高齢者及び20歳未満の人
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人
 - 腹痛、胸痛、口内炎、のどの痛み・のどのはれ

- (6)次の診断を受けた人
 - 心臟疾患(心筋梗塞,狭心症,不整脈),脳血管障害(脳梗 塞, 脳出血等), バージャー病(末梢血管障害), 高血圧, 甲状腺機能障害、褐色細胞腫、糖尿病(インスリン製剤を 使用している人), 咽頭炎, 食道炎, 胃・十二指腸潰瘍. 肝臓病. 腎臓病(症状を悪化させたり. 現在使用中の 薬の作用に影響を与えることがある。)
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので, 直ちに使用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師 又は登録販売者に相談すること

関係部	位	症
ロ · の	ど	口内炎, のどの痛み
消化	器	吐き気・嘔吐,腹部不快感,胸やけ,食欲不振,下痢
皮	膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神紀	系	頭痛, めまい, 思考減退, 眠気
循環	器	動悸
その	他	胸部不快感.胸部刺激感.顏面潮紅.顏面浮腫.気分不良

- 3. 使用後,次のような症状があらわれることがあるので,このよ うな症状の持続又は増強が見られた場合には,使用を中止し、 この文書を持って医師,歯科医師,薬剤師又は登録販売者に 相談すること
- (1)口内・のどの刺激感、舌の荒れ、味の異常感、唾液増加、歯肉炎 (ゆっくりかむとこれらの症状は軽くなることがある。)
- (2)あごの痛み

(他に原因がある可能性がある。)

- (3) しゃっくり、げっぷ
- 4. 誤って定められた用量を超えて使用したり、小児が誤飲した 場合には、次のような症状があらわれることがあるので、その 場合には、この文書を持って直ちに医師、薬剤師又は登録販売 者に相談すること

吐き気.唾液増加.腹痛.下痢,発汗.頭痛.めまい.聴覚障害,全身 脱力(急性ニコチン中毒の可能性がある。)

5.3ヵ月を超えて継続する場合は、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること

(長期・多量使用によりニコチン依存が本剤に引き継がれるこ とがある。)

効能

禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

用法・用量

タバコを吸いたいと思ったとき、1回1個をゆっくりと間をおきながら、30~60分 間かけてかむ。1日の使用個数は表を目安とし、通常、1日4~12個から始めて適 宣増減するが、1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら (1ヵ月前後).1週間ごとに1日の使用個数を1~2個ずつ減らし.1日の使用個数 が1~2個となった段階で使用をやめる。なお、使用期間は3ヵ月をめどとする。

	99	使用開始時の1日の)使用個数の目安
1回量	1日最大使用個数	禁煙前の1日の喫煙本数	1日の使用個数
20		20本以下	4~6個
1個	24個	21~30本	6~9個
		31本以上	9~12個

〈用法・用量に関連する注意〉

- タバコを吸うのを完全に止めて使用すること。
- 2. 1回に2個以上かまないこと(ニコチンが過量摂取され、吐き気、 めまい、腹痛などの症状があらわれることがある。)。
- 辛みや刺激感を感じたらかむのを止めて、ほほの内側などに寄せ て休ませること。
- 4. 本剤はガム製剤であるので飲み込まないこと。また、本剤が入れ歯
- などに付着し、脱落・損傷を起こすことがあるので、入れ歯などの 歯科的治療を受けたことのある人は、使用に際して注意すること。
- 5. コーヒーや炭酸飲料などを飲んだ後、しばらくは本剤を使用しな いこと(本剤の十分な効果が得られないことがある。)。
- 6. 口内に使用する吸入剤やスプレー剤とは同時に使用しないこと(口 内・のどの刺激感のどの痛みなどの症状を悪化させることがある。)。



② 裏面の接着されていない角から フィルムをはがします。

この包装は小児が容易に開けられないよう、フィルムとアルミの多層シートになっています





3 アルミを破り.指でガムを押し取

らく置きます(味がなくな ますので、なめたり、かむ回数を減らすな

ゆっくりかむ



に包んで捨ててください

ほほと歯ぐきの間

約30~60分で捨てる

成分

1個中、次の成分を含有する。

ニコチン 2mg

添加物:イオン交換樹脂、キシリトール、アセスルファムカリウム、 炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、酸化マグネシウム、タルク、 炭酸カルシウム、ジブチルヒドロキシトルエン、

保管および取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (高温の場所に保管すると、ガムがシートに付着して取り出しにくくなる。)。
- 2. 本剤は小児が容易に開けられない包装になっているが、小児の
- ハッカ油、Q-メントール、アラビアゴム末、酸化チタン、カルナウバロウ、 その他9成分

- 手の届かない所に保管すること。
- 3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる。)。
- 4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 5. かみ終わったガムは紙などに包んで小児の手の届かない所に捨 てること。

禁煙達成への心がまえ《まずは強い禁煙意志をお持ちください》

- 禁煙しなければならない理由をよく考えましょう。
- ご自身にとって禁煙することの長所,短所を考えて,見比べてみましょう。
- 禁煙に成功した後の健康的な生活を送るご自身を想像してみましょう。
- ストレスがあると感じて いたら、原因は何か考え てみましょう。そして、そ のストレスを発散する方 法を探してみてください。




しましょう。

クスできる方法を実行 記念日にしてみてくださ い。初心が忘れ難くなり ます。



●ストレスを和らげ、リラッ●禁煙開始の日を何かの●家族、同僚や知人に禁煙●スポーツ、散歩、趣味など 宣言をしましょう。ご自 タバコを忘れる努力を 分の禁煙意志が強化さ しましょう。 れるでしょう。







◆禁煙に伴うイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状に悩まされるのは禁煙開始から1~2週間の間です。ニコレットを十分量使用し、初めから無理に減らそうとしない方が効果的です。

緊急時・中毒等の連絡先 製品及び禁煙に関するお問い合わせ先

ニコレット禁煙支援センター

フリーダイヤル 0120-250103

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

●ニコレット ホームページ

https://www.nicorette.jp/

製造販売元 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

®登録商標 ©J&JKK2020

禁煙補助剤 nicorette

で使用の手引き

~禁煙プログラムについて~

この製品はタバコをやめたいと望む人のための、ガムタイプ の禁煙補助剤です。本剤は禁煙時のイライラ・集中困難など の症状を緩和し、あなたを無理なく禁煙へと導きます。

「ご使用の手引き」では製品の使用方法等をわかりやすく解説 し、喫煙のメカニズムや禁煙するためのアイデアをたくさん盛 り込みました。

さあ、この手引きをきちんと読んで、禁煙にチャレンジしま しょう。

なかなか禁煙できない…その理由とは?

身体的依存(薬物依存)


習慣的に喫煙すると、ニコチン依存という一種の薬物依存症になると 考えられます。ニコチンは脳に働いて快感をもたらしますが、習慣性 が強まると喫煙していないとイライラしたり、物事に集中できなくな ったり、落ち着きがなくなったりします。これらをニコチン離脱症状と いい、この症状が辛いがために禁煙が難しいものになっているのです。



禁煙に導くための治療

禁煙成功への道

禁煙はあくまで本人の意志で達成されるものです。しかしながら、禁煙 プログラムに従って本剤を使用することで、ニコチン離脱症状を和ら げ、無理なく禁煙を達成することができます。



喫煙の害を知ろう!

健康を損う恐れがあります。

喫煙が関連している疾患には、肺がんをはじめとするがんや、循環器、消 化器、呼吸器などの多くの疾患があります。なかでもがんと、虚血性心疾 患(心筋梗塞、狭心症)は日本では死亡原因の1位と2位を占める重要な 疾患です。WHO(世界保健機関)や欧米の保健省では喫煙を「予防できる 病気の最大にして単一の原因」と位置付け、積極的に禁煙に取り組んで います。



緊急時・中毒等の連絡先 製品及び禁煙に関するお問い合わせ先

ニコレット禁煙支援センター

フリーダイヤル 0120-250103

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

(財)日本中毒情報センター 中毒110番

大阪 TEL:072-727-2499 (365日 24時間対応) つくば TEL:029-852-9999 (365日 9:00~21:00)

副作用被害救済制度 フリーダイヤル 0120-149-931

心理的依存(生活習慣)

一般的に人は毎日の習慣に依存しているといわれています。家族や友 人との語らい、食事、趣味など日々の行動の中に快感を見出してストレ スを解消したりしています。喫煙はこの習慣の一つであり、手軽にこう した快感(リラックス感)を得られる手段でもあります。

根強い生活習慣となっている喫煙

一日中が喫煙タイム







禁煙中に覚えておいてほしいこと

禁煙によるメリット

- タバコ代がかからなくなった
- 食べ物がおいしくなった
- タバコのにおいがなくなり、周りの人に喜ばれた
- タバコが吸えない場所も、気兼ねなく行けるようになった
- 家の中が汚れなくなった


ピンチ時の対処法

禁煙中は、イライラしたり、どうしてもタバコが吸いたくなったりと、だれにでもピンチが訪れます。 そんなときの対処法をご紹介しましょう。これらを参考に自分にあった対処法を見つけましょう。

- 好きな音楽を聴く
- 冷たい水や熱いお茶を飲む
- 部屋の片づけをする
- シャワーを浴びる
- 歯を磨く ストレッチや散歩・軽い運動をする
- 禁煙の目的を思い出す

周囲の人達の健康に影響を及ぼします。

自らはタバコを吸わないのに他人のタバコの煙にさらされて吸ってしま うことを「受動喫煙」と呼びます。タバコの煙には、「主流煙」(喫煙者が口 から直接吸い込む煙)と、「副流煙」(火のついた部分から立ち昇る紫煙) の2種類があり、副流煙のほうが有害物質の含有量が高いことが知られ ています。ですから、タバコを吸わない大切な家族や会社の仲間に対し て啖煙者は加害者となりうるのです。



禁煙プログラム

まず最初に心構えをしっかりと

- ■禁煙しなければならない理由をよく考えてみる。
- ■自分にとっての禁煙のメリットを知る。
- ■禁煙に成功し、はつらつとした健康的な生活を送る自分をイメー ジしてみる。
- ■自分の喫煙習慣を分析する。(1週間の記録をとって研究してみま しょう。いつどこで注意すればよいか見えてきます。) 気持ちの整理ができたら喫煙道具を片付けましょう。禁煙中はス トレスがかかります。できればストレスの少ない時期に禁煙を開 始することをおすすめします。

禁煙チャレンジの継続



禁煙になれてきたら(1ヵ月前後)本剤の使用量を次第に**減らし** ていきます。(下記の禁煙カレンダーなどを利用して使用個数を常に 確認しましょう。)つい喫煙を再開してしまうことのないよう生活習 慣を再度チェック。1日の使用個数が1~2個となった段階で使用 をやめてください。なお、使用期間は3ヵ月をめどとしてください。

体調はいかがですか? 咳やたんが少なくなり、 身も心もさわやかになってきた のではないでしょうか。

つい1本が命取り! いつも本剤を 手放さないように してください。

食事もおいしく 感じられるのではないでしょうか。 ついつい食べ過ぎて太りすぎに ご用心ください。

い炭煙してしまうような場所には できるだけ近づかないようにしましょう。 散歩、スポーツ、趣味などで タバコを忘れる努力をしましょ


さあ、禁煙スタートです。

ニコチン離脱症状が特に強く現れるのは禁煙開始後1~2週間です。 初めは無理に本剤の使用個数を減らそうとせず、タバコを吸いたい と思った時にお使いください。(1日の使用個数は24個を超えない こと。詳しい用法用量は裏面をご覧下さい。)

プラス思考

- 家族や同僚に禁煙宣言をする。
- ・ 散歩、スポーツ、趣味をもつなどタバコを忘れる努力をする。
- ストレスを和らげ、リラックスできる方法をみつける。
- ●炭煙を思い出させるような場所や会合などはできるだけ避けるようにする。
- ●苦あれば楽あり、きっと禁煙が成功し健康になれると、すべてを良いほうに考

使用量の目安



禁煙カレンダーを上手に活用するために


禁煙カレンダーは禁煙を成功させるためのいわば"カルテ"です。毎月使用した個数を記入し、もし吸いたくなったら、この禁煙カレンダーで1日の使用量が 少なくなってきていることを確認し、禁煙の成功に近づいていることを実感しましょう。











第5週

第57日	月	日()曜日	1日領奴
第58日	月	日()曜日	1日個数
第59日	月	日()曜日	1日個数
第60日	月	日()曜日	1日個数
第61日	月	日()曜日	1日信数
第62日	月	日()曜日	1日個数
第63日	月	日()曜日	1日倒数



第36日	月	日()曜日	1日個数
第37日	月	日()曜日	1日偏数
第38日	月	日()曜日	1日侯数
第39日	月	日()曜日	1日個数
第40日	月	日()曜日	1日偏数
第41日	月	日()曜日	1日個数
第42日	月	日()曜日	1日個数



第15日	月	日()曜日	1日無数
第16日	月	日()曜日	1日個数
第17日	月	日()曜日	1日偶数
第18日	月	日()曜日	1日銀数
第19日	月	日()曜日	1日保数
第20日	月	日()曜日	1日銀数
第21日	月	日()曜日	1日個数

第3週 📷







第71日	月	日()曜日	1日偶数
第72日	月	日()曜日	1日個数
第73日	月	日()曜日	1日個数
第74日	月	日()曜日	1日個数
第75日	月	日()曜日	1日個数
第76日	月	日()曜日	1日儒数
第77日	月	日()曜日	1日偶数

第11週 📷

第78日	月	日()曜日	1日倒数
第79日	月	日()曜日	1日個数
第80日	月	日()曜日	1日個数
第81日	月	日()曜日	1日個数
第82日	月	日()曜日	1日偏数
第83日	月	日()曜日	1日偏数
第84日	月	日()曜日	1日偏数