

# 第3類医薬品



✂ ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保管してください。

## 南天のど飴G(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

**使用上の注意** [してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください／他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など) **【相談すること】** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人。 高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症状          |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |

| 年 齢       | 1回量         | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|
| 成人(15才以上) | 3錠          | 3回     |
| 8才以上15才未満 | 2錠          |        |
| 5才以上8才未満  | 1錠          |        |
| 5才未満      | 服用しないでください。 |        |

**効能・効果** せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ **用法・用量** 食間に服用してください。左表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまずに

ゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成分・分量** 1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス500mg 添加物：白糖、水アメ、ハチミツ、クエン酸、l-メントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、香料(エタノール、

プロピレングリコール) **保管および取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はチャックを閉じて保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal

製造販売元  
常盤薬品工業株式会社  
大阪市中央区安土町3-5-12  
NOEVIR GROUP  
南天のど飴のブランドサイトはこちら  
<http://nodoame.jp>

お問い合わせは  
常盤薬品工業株式会社  
お客さま相談室0120-875-710まで  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度  
0120-149-931

067497  
TISL601