

毎日のつらい痛み

# サロンパス<sup>®</sup> EX インドメタシン 3.5%

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

## 商品の特長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

## ⚠ [使用上の注意]

❌ **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の人は使用しないでください。
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3)11歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
  - (1)目の周囲、粘膜等。
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。



## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】** 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

**【用法・用量】** 表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)11歳未満の小児に使用させないでください。
- (2)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4)患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5)皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

**【成分・分量】**

成分	含量(膏体100g中)
インドメタシン	3.5g
l-メントール	3.5g

添加物として、エデト酸Na、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

〈包装〉5.4cm × 8.56cm …………… 20枚入、40枚入、60枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)