

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。

メンソレータム®
やわらか素肌
クリームU



尿素20%+ビタミンE誘導体 配合



第3類医薬品

皮フ軟化薬

コチコチかかと こすらずなめらか ガサガサ手荒れしっかりうるおす

長年のうちにかたくなったかかとのお手入れ、大変です。「かたく荒れたかかと」は、皮フの衰えと摩擦・伸縮のくりかえしで肌の柔軟性が落ち、角質層の水分を失ったうるおい不足の肌質が原因です。メンソレータムやわらか素肌クリームUは、尿素20%とビタミンEを配合し、かたく荒れた皮フにしみこんで、内側からしっかりと多量の水分をつかまえて放さないから、コチコチだったかかとも、ぬるだけで肌をいためず、すっきりなめらかなもとのやわらかさにもどしていきます。もちろんガサガサになった手荒れや、黒ずんだひじ・ひざの荒れにもすぐれた効果をあらわします。

空気の乾燥・冷え、水仕事、老化による保水力・新陳代謝・柔軟性の低下が原因です。



●水分 ●尿素
▲ビタミンE誘導体

有効成分がじっくり浸透して、健康なやわらか素肌をとりもどします。

3つの有効成分

**グリチルリチン酸
モノアンモニウム**
(抗炎症剤)

炎症を、修復しながら鎮めます。

尿素
(角質軟化剤)

体の中の水分を皮フ表面の角質層に効率的にとりこむ一方で、クリームの中の水分も吸収して皮フの保水量を増加させます。

**トコフェロール
酢酸エステル**
ビタミンE誘導体
(血流改善剤)

血行を促進、新陳代謝を高めて皮フの生まれ変わりを活発にします。

ワセリン
(油性基剤)

薄い保護膜を形成します。



こんな方に

ガサガサ
手荒れ

黒ずんだ
ひざ・ひじの
ザラザラ



コチコチ
かかとの
角質

スクワラン
(油性基剤)

人の皮脂にも含まれています。

夜のお手入れもおすすめ



夜10時から午前2時くらいは、お肌の新陳代謝がよくなるといわれています。お風呂上がりや、寝る前にもメンソレータムやわらか素肌クリームUでのお手入れをおすすめします。

もとのやわらか素肌に

美しく健康な皮フは、見た目にはうるおいやハリがあって生き生きとしているだけでなく、角質層が水分と油分をバランスよくためこみ、キメが整っています。また、古くなった角質をはがし、新しい角質を生み出す新陳代謝が活発に行われていますので、弾力のある、やわらかくなめらかな肌ざわりをしています。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ) 部位。
- (3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効 能 ・ 効 果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

用 法 ・ 用 量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部にのみ使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成 分 (1g中)

- 尿素 200mg
- トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 5mg
- グリチルリチン酸モノアンモニウム 5mg

添加物として、*l*-メントール、流動パラフィン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、スクワラン、ワセリン、カルボキシビニルポリマー、2-エチルヘキサン酸セチル、ペクチン、乳酸、トリエタノールアミン、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、パラベン、BHT、エドト酸Na、グリシンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに聴きたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT[®] ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1