

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



じんましの治療薬 ジンマート®

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

販売名：メンソレータム® ジンマート®


じんましんとは？

じんましんは疲れやストレス、温度変化、衣類の締め付けなど様々な刺激や要因で発生し、はれや赤みを伴ったつらいかゆみが広がっていきます。

肌にかゆみを感じ、
かくとかゆみが広がる

疲れたなと思っていたら、
なんだか肌がかゆくなってきた

夜布団に入ると、
はれとかゆみで眠れない



ジンマートは、はれてかゆいじんましんに多角的アプローチ！

① 3つのかゆみ止め成分が広がるかゆみに効く！

ジフェンヒドラミン塩酸塩

リドカイン

クロタミトン

l-メントール

酸化亜鉛

グリチルリチン酸二カリウム

② 冷感・収れん・抗炎症作用で赤くはれた皮ふを
スーッと鎮める。

イメージ図

3つのかゆみ止め成分

ジフェンヒドラミン塩酸塩

かゆみの原因物質「ヒスタミン」の働きをブロックし、かゆみを止めます。

リドカイン

かゆみ神経の働きを弱めます。

クロタミトン

温感神経に働き、かゆみを素早く鎮めます。

冷感・収れん・抗炎症成分

l-メントール

清涼感を与え、かゆみを鎮めます。

酸化亜鉛

患部を収れんし、はれを抑えます。

グリチルリチン酸二カリウム

患部の炎症を抑えます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷のあるところ

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

じんましん、かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、しもやけ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部にぬってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

成分(1g中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・20mg、クロタミトン・・・50mg、リドカイン・・・20mg
l-メントール・・・20mg、酸化亜鉛・・・30mg、グリチルリチン酸二カリウム・・・1mg

添加物として、グリセリン、ワセリン、セタノール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パルミチン酸イソプロピル、マイクロクリスタリンワックス、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィン、ヒドロキシエチルセルロース、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ジメチルポリシロキサン、パラベン、エドト酸Na、pH調整剤を含有する。

ステロイド成分は配合しておりません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西1-8-1

401576901