

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

販売名:ロートアルガードクリアブロックZⅡ

ロートアルガード® クリアブロック® ZⅡ

【アレルギー症状が続き、かつ炎症を伴う方におすすめします】

第2類医薬品

製品の特徴

※既承認一般眼科用薬中
(平成28年7月現在)

花粉などのつらい目のかゆみ・充血に効く!

全
有効成分
最大濃度
配合※

抗炎症成分ダブル配合

プラノプロフェン
×
グリチルリチン酸二カリウム

抗アレルギー成分 クロモグリク酸ナトリウム

抗ヒスタミン成分 クロルフェニラミンマレイン酸塩

角膜保護成分 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

従来的一般用アレルギー用点眼剤を2日間位使用し、十分な効果が得られなかった方におすすめします。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイ
ケアできて、
とっても便
利です。

ワンタッチ式スクリュューキャップ



開ける時は左に
1回カチッと回し、
閉める時も右に
1回カチッと回す
だけ。簡単便利です。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は使用しないでください。

(1) 7才未満の小児 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人

2 点鼻薬と併用する場合には、乗物または機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがある)



相談すること



1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。
- (4) 次の症状のある人: はげしい目の痛み (5) 次の診断を受けた人: 緑内障
- (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。

- 片方の目だけに症状がある場合 ● 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力にも影響がある場合

2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ(目のまわりを含む)、刺激感、異物感、なみだ目、目やに、痛み
その他	息苦しさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様 症状	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 (1)症状が悪化した場合 (2)目のかすみが改善されない場合(緑内障などの可能性も考えられる) (3)2日間使用しても症状がよくなる場合
- 4 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1~2滴、1日4回点眼してください。

●用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる)また、混濁したものは使用しないでください。
 (3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
 (一旦レンズを外してから点眼してください。)
 (4)点眼用にのみ使用してください。(5)用法・用量を厳守してください。



成分・分量

有効成分	配合量
クロモグリク酸ナトリウム	1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%
プラノプロフェン	0.05%
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ℓ-メントール、d-カンフル、BHT、ポリソルベート80、ユーカリ油、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
 (2)キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
 (3)小児の手の届かない所に保管してください。
 (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 (5)他の人と共用しないでください。(6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
 (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってご使用ください。(8)容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)