

効能効果: きの消毒・洗浄

用法用量 そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。
〈用法用量に関連する注意〉 (1) 用法用量を厳守してください。(2) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(5) 外用にのみ使用してください。

成分分量 過酸化水素(H_2O_2) 2.5～3.5w/v%を含有します。
添加物: フェナセチン、リン酸

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない冷所(30℃以下)に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



HapYcom

第3類医薬品

外用殺菌
消毒薬

日本薬局方
オキシドール
Oxydol



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

用法・用量

そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

△使用上の注意

してはいけ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
ないこと が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談する 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
こと に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お問い合わせ先
☎06(6231)5626