乾燥肌治療

17411

クリーム

第2類医薬品

0.3%配合

へパリン類似物質

カーペールドッシーム



0.3%配合

第2類医薬品



第2類医薬品

販売名: ヒルマイルドクリーム

ご使用に際して、外箱の説 明文を必ずお読みくださ い。また、必要な時に読め るよう大切に保存してくだ さい。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化 したり、副作用が起こりやすく なります)

- 1. 次の人は使用しないでください
- (1) 出血性血液疾患(血友病、 血小板減少症、紫斑病等) の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結 果をきたすことが予想され る人。(血液凝固抑制作用 を有し出血を助長するおそ れがあります。)
- 2. 次の部位には使用しないでく ださい 目や目の周囲、粘膜(口腔、 鼻腔、膣等)。

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤 師又は登録販売者に相談して ください
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症 状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれ た場合は副作用の可能性があ るので、直ちに使用を中止し、 この外箱を持って医師、薬剤 師又は登録販売者に相談して ください

関係部位		症状
皮	ıZı	発疹・発赤、 かゆみ、はれ、 紫斑

3.5~6日間使用しても症状が よくならない場合は使用を中 止し、この外箱を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談 してください

しっとり潤うクリームタイプ

ヘパリン類似物質配合 顔や手足の乾燥肌治療に

- 使いやすいワンタッチキャップ採用
- ●ステロイド無配合
- 無着色

ヘパリン類似物質の作用



おすすめの使い方

1日1~数回、洗顔後や入浴後などの清潔な肌に手で適量を塗ってください。





衣類による 乾燥・荒れに



お風呂



赤ちゃんにも!



健栄製薬(株)お問い合わせ先 電話番号(06)6231-5822 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【効能効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法用量】

1日1~数回、適量を患部に すりこむか、又はガーゼ等に のばして貼ってください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、 保護者の指導監督のもとに 使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(4) 外用にのみ使用してください。 【成分分量】

100g 中 へパリン類似物質 0.3g 含有 添加物:サラシミツロウ、セレシン、白色ワセリン、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、グリセリン、軽質流動パラフィン、スクワラン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラオキシ安息香酸メチルシ安息香酸メチル

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保 管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使 用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話0120-149-931(フリーダイヤル)