

【この説明書は、本剤とともに保管し、
ご使用の際には、必ずお読みください。】

メモA

第2類医薬品

外傷用軟膏

- メモAは、殺菌剤、傷の痛みをしずめる局所麻酔剤、傷の治りをはやめる成分などを配合したなめらかで伸びのよい軟膏です。
- 有効成分が、きり傷、すり傷、やけどなどにすぐれた効果をあらわします。
- ご家庭の常備薬として、またスポーツ時や旅行の際の携帯薬としてご使用いただけます。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなります。）

① **次の人は使用しないでください**

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレ
ルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

① **次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがあ
る人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

② **使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性
があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持っ
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
<u>ショック</u> <u>(アナフィラキシー)</u>	<u>使用後すぐに、皮膚のかゆみ、</u> <u>じんましん、声のかすれ、く</u> <u>しゃみ、のどのかゆみ、息苦し</u> <u>さ、動悸、意識の混濁等があら</u> <u>われる。</u>

③ **5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用
を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください**

効能・効果

- きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ
- 軽度のやけど
- 創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

成分

1g中

クロルヘキシジングルコン酸塩液……………10mg
ジブカイン塩酸塩……………3mg
アラントイン……………10mg
トコフェロール酢酸エステル
(ビタミンE酢酸エステル)……………1mg
酸化亜鉛……………50mg

添加物：パラフィン、ワセリン、サラシミツロウ、トリオレイン酸ソルビタン、フェノール、チモール、香料

きり傷、すり傷、軽いやけどの治療は・・・

きり傷、すり傷などのちょっとした傷や、軽いやけどであっても早めのお手当が大切です。次のようなことに気をつけてお手当してください。

- 傷口に砂や小石などが付着している場合は水道水などできれいに洗い流し、かわかした後、**メモA**を塗布しましょう。
- やけどをしたら、患部をすぐに冷たい水につけて冷やし、その後**メモA**を塗布しましょう。
- 傷口がふさがるまでは、絆創膏、ガーゼなどで患部を保護するようにしましょう。
- 傷口にできたかさぶたは、無理にはがさないようにしましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>