

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

デリケートな部位などのかゆみに



VIOLAO ケア

ヴィオラオ

〈鎮痒消炎剤〉

第2類医薬品

販売名：クリニラボ VIOLAOケア

- ◆クリニラボ VIOLAOケアは、デリケートな部位などのかゆみ、かぶれ治療薬です。
- ◆抗ヒスタミン成分ジフェンヒドラミンと局所麻酔成分リドカインがかゆみを鎮め、グリチルレチン酸が炎症を抑えます。
- ◆爽やかな清涼感でべたつかず、のびのよい非ステロイド系のクリームです。



## 使用上の注意 相談すること



### ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

### ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

### ③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、虫さされ、しもやけ

## こんな時に



- 脱毛処理後のかゆみに
- 下着の摩擦によるかゆみに
- 汗蒸れ、生理、おりものなどによるかぶれに

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### [注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

## 成 分

100g中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	2g	局所麻酔作用でかゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	1g	患部の炎症を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	雑菌繁殖を抑制します。
l-メントール	0.5g	清涼感を与えます。

添加物：ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、二酸化ケイ素、トウモロコシデンプン、1,3-ブチレングリコール、エデト酸Na、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na、グリシン、DL-アラニン、カルボキシビニルポリマー、香料、ビタミンE

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。  
(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)  
※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元 大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元 新新薬品工業株式会社

富山県富山市今市324番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)