



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

止瀉薬

下痢・食あたり・水あたりに

スメクタテスミン®

スメクタテスミンは…

主に地中海地方で産出の天然ケイ酸アルミニウムを配合し、腸内において有害物質などを吸着することで、下痢・食あたり・水あたりに効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 高齢者。
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



〔効 能〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

〔用法・用量〕

下記の1回服用量をそのまま服用するか、コップ半分の水に入れ、よくかき混ぜて服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回を限度とします
11~14才	$\frac{2}{3}$ 包	
11才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量と働き〕 1包(3.76g)中

成 分	分 量	働 き
天然ケイ酸アルミニウム	3,000mg	腸内において有害物質などを吸着することで下痢、食あたり、水あたりに効果をあらわします。

添加物として、サッカリンNa、ブドウ糖、バニリンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元(輸入) **佐藤製薬株式会社**
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
Manufactured by and under license from
IPSEN
原産国:フランス