

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるように大切に保管してください。

ユースキン® リカAソフトP

第3類医薬品

あせもパウダー^{II}クリーム_{配合}

販売名：ユースキン リカAソフトP 鎮痒消炎剤

ユースキン リカAソフトPは、

- さらっとのびの良いクリームが、バイ菌の繁殖を抑え、あせも・かぶれを治します。
- さらさらパウダー配合。白く粉っぽくならず、のびが良いので、すばやく患部にぬることができます。



使用上の注意

相談すること



- (1) 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
 - ①医師の治療を受けている人
 - ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - ③湿潤やただれのひどい人
- (2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

■ 効能：あせも、かぶれ、しっしん、皮膚炎、かゆみ、ただれ、じんましん

■ 有効成分(1g中)

有効成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみを止めます。
グリチルレチン酸	5mg	炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	5mg	菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
酸化亜鉛	50mg	収れん・乾燥作用で患部の治りを早めます。

- 本剤にステロイドは配合されていません。

添加物として：グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシロキサン、キサンタンガム、ステアリン酸、イソステアリン酸、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油20、パラベン

■ 使用法：患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

1. 定められた使用法を守ること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。なお、使用開始の目安は、生後3ヶ月以上です。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
4. 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
5. 小児が誤って口にした場合には、まず、口の中をふき取ること。しばらく様子を見て異常がある場合には、医師に相談すること。

■ 保管及び取扱い上の注意：

1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わることがある。)



ユースキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚1-1-11

MADE IN JAPAN

お客様相談室 ☎0120-22-1413
土・日・祝日を除く9:00～17:00
<http://www.yuskin.co.jp>