

ご使用の前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時は読めるように保管してください。
「用法・用量」・「用法・用量に関連する注意」・「保管及び取扱い上の注意」等については、裏面をよくお読みください。

アカギレ、切傷、さかむけに！

液体絆創膏 **エキバンA**[®] 第3類医薬品

製品特徴


- 液体絆創膏「エキバンA」を傷口に塗布すると、透明な被膜を形成し、外からの水やバイ菌・ホコリなどの侵入を防ぎます。
- 形成した透明な被膜は、お湯や水にもはがれにくいので、様々なシーンで使用できます。



ご家庭での
水仕事に



ご家庭での
園芸時に



お風呂、プール
などの入水時に



スポーツ、海・山
のレジャー時に



美容院、理髪店
の職場で



農業・漁業
の職場で



傷口への塗布の際は、一瞬しみますが乾くと刺激はなくなります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - ① 大きな切傷、深い切傷、ただれ、化膿、やけど、出血している患部
 - ② 目や目のまわり等、皮膚の敏感な部位、粘膜等
 - ③ 顔面、頭部
 - ④ ひげそり、脱毛、除毛、脱色等により傷んだ皮膚



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ① 医師の治療を受けている人
 - ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. ご使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

効能・効果

アカギレ、切傷、さかむけ

用法・用量

患部に適量塗布

(用法・用量に関連する注意)



① 定められた用法・用量を守ってください。

② 本剤は外用にのみ使用し、内服はしないでください。

③ 目に入らないように注意してください。

万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い直ちに眼科医の診療を受けてください。

④ 数回の水仕事や入浴で被膜がはがれてきた時は、乾かした後に再びエキバンAを塗ってください。

⑤ 形成した被膜を無理にはがそうとすると、皮膚を傷めてしまう可能性があります。

はがす際には、注意してください。

⑥ 傷口以外に広く塗らないでください。

⑦ 薬液により傷口を刺激するため、小児に使用の際にはご注意ください。

又、ご使用の場合は、保護者の監督のもとで使用ください。

⑧ 有機溶剤が含まれているので、気管支炎（喘息等）のある方は、注意してください。

成分・分量（100g 中）

主成分	分量
ピロキシリン	15g

添加物として、dl-カンフル ベンジルアルコール ヒマシ油
酢酸エチル 酢酸ブチル

保管及び取扱い上の注意

① 小児の手の届かないところに保管してください。

② 直射日光をさけ、涼しいところに密栓して保管してください。

③ 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

④ 火気に近づけないでください。

⑤ 使用期限を過ぎたものについてはご使用にならないでください。

⑥ ご使用後はチューブの口についた薬液をよくふきとってから、キャップで密栓し保管してください。

⑦ 衣類等につきますと取れにくくなりますので、充分注意してください。

⑧ 急いではがしたいときは、本剤を上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください。

製品についてのお問い合わせ先

●お客様相談室 ☎ 0120-703-607
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売

TA HE タイヘイ薬品株式会社
茨城県古河市駒込969-3