

プラセンタ製剤

プラセンタ製剤

プラセンタエキス
ビタミンB₁・B₆配合

プラセントップ®
液

《滋養強壯剤》

Placen-Top
ORAL-SOLUTION



製造販売元

 スノーデン 株式会社

東京都千代田区岩本町3-7-16

第2類医薬品

Placen-Top
ORAL-SOLUTION

【効能・効果】

- 滋養強壯 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(30mL)を服用してください。15歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)よく振ってから服用してください。
- (2)用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせ先

 スノーデン 株式会社

お客様相談室 電話 03-3866-2459
受付時間 8:50~12:00、13:00~17:30
(土・日・祝は除く)

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

△使用上の注意

相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹
消 化 器	軟便

- 2.しばらく服用しても症状の改善が見られない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【成分・分量】 1瓶(30mL)中
絨毛組織加水分解物… 600.0mg
(プラセンタエキスとして2,000mg)
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)

…5.0mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)… 5.0mg

ニコチン酸アミド…20.0mg

無水カフェイン…50.0mg

*添加物として、エリスリトール、スクラロース、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿または浮遊を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。

第2類医薬品

プラセンタエキス(胎盤成分)
2000mg配合

プラセントップ液[®]

プラセンタ
エキスには

・アスパラギン酸

・トレオニン

・セリン

・グルタミン酸

・グリシン

・アラニン

・バリン

・メチオニン

・イソロイシン

・ロイシン

・チロシン

・フェニルアラニン

・リジン

・アルギニン

・プロリン

などのアミノ酸が
含まれています。

開け口↓

ここを押す

※軽く押し引き上げて下さい。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)