

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

マキロンS

第3類医薬品

殺菌消毒薬

## △使用上の注意 ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 患部が広範囲の人
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3. 5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

## 【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

## 【成分・分量】(100mL中)

ベンゼトニウム塩化物……………0.1g  
アラントイン……………0.2g  
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.2g  
添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール

【使用法】 1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。〈使用法に関連する注意〉(1)使用法を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。

製造販売元  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5)持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れることがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

お問い合わせ先：お客様相談室  
電 話 0120-337-336  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



本品は透明フィルム  
で包装しています。

〈注意〉1.使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2.使用に際しては、説明文書をよく読むこと。3.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。4.小児の手の届かない所に保管すること。

〈お問い合わせ先〉  
第一三共ヘルスケア(株)  
お客様相談室  
電話 0120-337-336

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN 登録商標 K

▼この部分を切りとって下さい。