



キズの殺菌消毒に

マキロン[®]S

皮膚の修復成分配合

殺菌消毒薬

第3類医薬品

外用専用/75mL
マキロンS

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分・分量(100mL中)

ベンゼトニウム塩化物・・・0.1g

アラントイン・・・0.2g クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.2g

添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先:お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

**使用前にこの説明
文書を必ずお読み下さい。**

使用法：1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。〈使用法に関連する注意〉(1)使用法を厳守すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5)持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れることがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

⚠ 使用上の注意  **相談すること** 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)患部が広範囲の人 (4)深い傷やひどいやけどの人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

本品は透明フィルムで包装しています。  登録商標

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

| **使用期限** **製造番号**