

この説明文書は服用前に必ずお読みください。  
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

## 総合かぜ薬（非ピリン系）

第2類医薬品

# パイロン<sup>®</sup>PL 錠 ゴールド

▼Product  
features



## ● シオノギヘルスケア

パイロンPL錠 ゴールドは、解熱鎮痛成分であるサリチルアミドとアセトアミノフェン、抗ヒスタミン成分であるプロメタジンメチレンジサリチル酸塩、痛みを抑えるはたらきを助ける無水カフェイン、せき中枢を抑えて、せきをしのぐデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、たんを出しやすくするプロムヘキシン塩酸塩の6つの有効成分の作用により、「せき」「たん」「のどの痛み」「発熱」「鼻みず」などのかぜの11症状にすぐれた効果を発揮する非ピリン系の総合かぜ薬です。



### 使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- (3) 15才未満の小児

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

#### 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください (眠気などがあらわれることがあります)

#### 4. 服用前後は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください



相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (4) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難

#### (5) 次の診断を受けた人

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状         | 関係部位 | 症 状      |
|-------|-------------|------|----------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   | 呼吸器  | 息切れ、息苦しさ |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | 泌尿器  | 排尿困難     |
| 精神神経系 | めまい         | その他  | 過度の体温低下  |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称   | 症 状   |
|---|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー)  | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。  |
| 腎障害   | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。  |

(裏面につづく)

|       |   |
|-------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく  | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。                                  |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

□のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

#### ……効能・効果……

かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

#### ……用法・用量……

次の量を食後なるべく30分以内に、水またはぬるま湯でおのみください。

| 年齢        | 1回量      | 1日服用回数 |
|-----------|----------|--------|
| 成人（15才以上） | 2錠       | 3回     |
| 15才未満     | 服用させないこと |        |

●定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります。）




#### ……成分・分量……

パイロンPL錠 ゴールドは、白色の錠剤で、6錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

| 成 分                  | 含量(6錠中) | はたらき               |
|----------------------|---------|--------------------|
| サリチルアミド              | 648mg   | 痛みをおさえ、熱を下げる       |
| アセトアミノフェン            | 360mg   |                    |
| 無水カフェイン              | 144mg   | 痛みをおさえるはたらきを助ける    |
| プロメタジンメチレンジサリチル酸塩    | 32.4mg  | 鼻みず、鼻づまり、くしゃみをおさえる |
| デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 48mg    | せきをしずめる            |
| プロムヘキシン塩酸塩           | 12mg    | たんの切れをよくする         |

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。



#### ……保管および取扱い上の注意……

(1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) PTPシートから出して他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり、品質が変化します）

(4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

#### ……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願ひいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

#### 「副作用被害救済制度」について

(独) 医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

®:登録商標

-----  
製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号