

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



91157

せき・たんに……

アネトン[®] せき止め錠

〈鎮咳去痰薬〉
第②類医薬品

アネトンせき止め錠は、いろいろな原因で起こる“せき”をしずめ“たん”の切れをよくします。また、飲みやすいフィルムコーティング錠で、12歳のお子様から服用できます。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 12歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 過量服用・長期連用しないでください（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌 尿 器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の量を、水又はお湯で服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 | さらに就寝前に1回服用することができます。 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 成 人（15歳以上） | 3錠 | 3回 （食後） | |
| 12歳以上 15歳未満 | 2錠 | | |
| 12歳未満 | 服用しないでください。 | | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- PTPシートからの錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

〈PTPシート取り出し図〉

**【成分・分量】**

アネトンせき止め錠は、淡黄褐色の錠剤で、成人1日量（12錠）中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

| 成 分 | 分 量 | は た ら き |
|----------------------|---------------------|---|
| コデインリン酸塩水和物 | 50mg | せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | 抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。 |
| 無水カフェイン | 60mg | 頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。 |
| セネガ乾燥エキス （原生薬換算量） | 89.82mg （1500mg） | 気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。 |

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、三二酸化鉄、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

**【包装】**

アネトンせき止め錠：48錠（PTP）

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-834-389
 9:00～17:00(土日祝除く)

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2