

効能効果：創傷面の殺菌・消毒

用法用量 本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。
(用法用量に関連する注意) (1) 用法用量を厳守してください。(2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。(3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。(4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(7) 外用にのみ使用してください。

成分分量 エタノール(C₂H₆O) 76.9～81.4vol%を含有します。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 火気に近づけないでください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用法 青キャップをとり瓶を倒立し、容器を軽くおさえ、脱脂綿又はガーゼに出して使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

HapYcom

第3類医薬品

殺菌消毒薬

日本薬局方 消毒用エタノール

(消毒用アルコール)



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

用法・用量 脱脂綿、ガーゼ等に浸して
患部に軽く塗ってください

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

△使用上の注意

してはいけ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

粘膜(口唇等)、目の周囲

相談する 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 患部が広範囲の人。(4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造
番号

使用
期限

買
置
期
間

お問い合わせ先
☎06(6231)5626