

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限（パッケージの側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

# 扁桃腺のはれ・痛みに **ハレナス**<sup>®</sup>

販売名：ハレナス

口腔・咽喉用薬 第3類医薬品

## 製品特徴

- トランエキサム酸とカンゾウエキスの2つの抗炎症成分が、扁桃腺のはれを鎮めます
- 水なしでも飲めて、患部に気持ちいい冷感がとどきます

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
(1) 甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬  
（むくみ、血圧上昇及び筋疾患（ミオパチー）等が起きることがある）  
(2) トランエキサム酸を含有する内服薬  
（鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等）

2. 長期連用しないこと

**👤 相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 次の症状のある人：むくみ  
(6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感、胃部膨満感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（裏面につづく）

## 効能・効果

扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)・咽頭炎、口内炎

## 用法・用量

次の量を朝昼晩に服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
7才以上15才未満	1/2包	
7才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●水なしでも服用できます

## 成分・分量

1日量(3包:3.9g)中

トラネキサム酸 ..... 750mg  
カンゾウエキス ..... 198mg(原生薬換算量990mg)  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) ..... 50mg  
リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) ..... 12mg  
L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム) ..... 500mg  
添加物として、エリスリトール、アルファ化デンプン、二酸化ケイ素、タルク、カラメル、無水ケイ酸、トメントール、香料を含有する

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)により、尿が黄色になることがあります
- (2) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります  
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

## 有効成分のはたらき

トラネキサム酸	抗炎症作用があり、のどのはれ・痛み等の症状を改善します
カンゾウエキス	主成分グリチルリチン酸の抗炎症作用で、のどのはれ・痛み等を改善します
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	粘膜の機能を正常に働かせる作用があります
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	
L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム)	体力消耗時のビタミンC補給になります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること  
また、保管した残りの薬剤はその日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)  
☎ **0120-5884-01**  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3  
MADE IN JAPAN