

HapYcom

税控除対象

# ホームパス Eα 德用

消炎鎮痛プラススター

第3類医薬品

4.2cm

6.5cm

原寸大

肩こり  
腰痛  
筋肉痛

ビタミン  
E配合

ムレにくく

肌にやさしい

[穴あきタイプ]

保存袋付

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

外用消炎・鎮痛貼付剤 Analgesic Patch

# ホームパスEα

サイズ6.5cm×4.2cm

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果:**腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

## 用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

**成分・分量** 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸メチル	6.29g
l-メントール	5.71g
dl-カンフル	1.24g
トコフェロール酢酸エステル	2.0g

添加物としてエステルガム、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリインブチレン、流動パラフィンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

HapYcom

# ホームパスEα

## 消炎鎮痛プラスター

開け口 →

徳用

ビタミンE配合  
穴あきタイプ

第3類医薬品

1日1~2回、患部に貼付

肩こり  
腰痛  
筋肉痛

徳用

第3類医薬品

# ホームパスEα

消炎鎮痛プラスター


肩こり  
腰痛  
筋肉痛



保存袋付

### 袋の開け方

袋の背面側の開封口より  
手で簡単に開封できます。



徳用

第3類医薬品

# ホームパスEα

消炎鎮痛プラスター

肩こり・腰痛  
筋肉痛

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または  
下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112

受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社大石膏盛堂  
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

副作用被害救済制度  
0120(149)931