*下線部:2019年7月改訂

**ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。**
**また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。**

せき・たんに……

# アネトン® せき止め液

〈鎮咳去痰薬〉
第②類医薬品

91153

**アネトンせき止め液**は、いろいろな原因で起こる**“せき”**をしずめ**“たん”**の切れをよくします。
また、さわやかなレモンティー風味の液剤です。

## 使用上の注意

### してはいけないこと

**【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】**

**1. 次の人は服用しないでください**
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)12歳未満の小児。*

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**（眠気等があらわれることがあります。）

**4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**5. 過量服用・長期連用しないでください**（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）

### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。
高熱、排尿困難
（6）次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|---|---|
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

**3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
便秘、口のかわき、眠気

**4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

**【効能・効果】**
せき、たん

**【用法・用量】**
年齢により次の量を服用してください。

| 年　　齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 | 症状により約４時間の間隔をおいて１日６回まで服用することができます。 |
|---|---|---|---|
| 成　　人（15歳以上） | 10mL | 3回 | |
| 12歳以上　15歳未満 | 6.5mL | | |
| 12歳未満 | 服用しないでください。 | | |

**〈用法・用量に関連する注意〉**
（1）用法・用量を厳守してください。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】**
アネトンせき止め液は淡褐色澄明の液剤で、成人１日量(60mL)中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

| 成　　分 | 分　量 | は た ら き |
|---|---|---|
| コデインリン酸塩水和物 | 50mg | せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。 |
| dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩 | 75mg | 気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 12mg | 抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。 |
| 無水カフェイン | 60mg | 頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。 |
| セネガ流エキス | 1500mg | 気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。 |

添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

**〈成分・分量に関連する注意〉**
本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

**【保管及び取扱い上の注意】**
（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
（4）使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は服用しないでください。




**【包装】**
アネトンせき止め液：100mL




**〈1回の服用量〉**




**本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。**
**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　お客様相談室　フリーダイヤル 0120−834−389**
**9:00〜17:00（土日祝除く）**


製造販売元
**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**
〒101-0065　東京都千代田区西神田3-5-2



©J&JKK 2021
®登録商標